

















Em gestantes com vacinação incompleta tendo recebido duas doses de vacina contendo o componente tetânico

CALENDÁRIO DE VACINAÇÃO INFANTIL

IDADE	VACINA	DOSE
 Ao nascer	Hepatite B BCG	1ª dose Dose única
 2 meses	Rotavírus Pentavalente Pneumocócica 13 Valente Hexavalente	1ª dose 1ª dose 1ª dose
 3 meses	Meningite ACWY Meningite B	1ª dose 1ª dose
 4 meses	Rotavírus Pentavalente Pneumocócica 13 Valente Hexavalente / Pentavalente	2ª dose 2ª dose 2ª dose
 5 meses	Meningite ACWY Meningite B	2ª dose 2ª dose
 6 meses	Rotavírus Pentavalente Pneumocócica 13 Valente Hexavalente Influenza (dose anual)	3ª dose 3ª dose 3ª dose 1ª dose
 7 meses	Meningite ACWY* Meningite B Influenza	3ª dose 3ª dose 2ª dose
 9 meses	Febre Amarela	dose única
 12 meses	Tríplice Viral Varicela Hepatite A	1ª dose 1ª dose 1ª dose
 13 meses	Pneumocócica 13 Meningite ACWY	Reforço Reforço
 14 meses	Meningite B	Reforço
 15 meses	Tríplice Viral Varicela Hexavalente / Pentavalente	2ª dose 2ª dose 1º Reforço
 18 meses	Hepatite A	2ª dose
 4 a 6 anos	dTpa + Salk Meningite A, C, W, Y	2º Reforço
 9 anos	HPV Dengue*	3 doses 3 doses
 10 anos	dTpa	Reforço

* Depende do fabricante da vacina utilizada nas demais doses - necessário avaliação do profissional
* Indicada para pacientes que já tiveram contato com o vírus - pacientes que já adquiriram a doença

CALENDÁRIO DE VACINAÇÃO ADULTOS



VACINAÇÃO DA MULHER (20-59 ANOS)

Vacinas	Esquemas e recomendações
HPV	Quadrivalente: 0-2-6 Oncogênica: 0-1-6
Tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola)	É considerada protegida a mulher que tenha recebido duas doses da vacina tríplice viral acima de 1 ano de idade e com intervalo mínimo de um mês entre elas.
Hepatites A, B ou A + B	Hepatite A: duas doses, no esquema 0 - 6 meses. Hepatite B: três doses, no esquema 0 - 1 - 6 meses. Hepatite A e B: três doses, no esquema 0 - 1 - 6 meses.
dTp acelular (difteria, tétano e coqueluche)	Com esquema de vacinação básico completo: reforço com dTpa a cada dez anos. Com esquema de vacinação básico incompleto: uma dose de dTpa a qualquer momento e completar a vacinação com dT (dupla adulto) de forma a totalizar três doses de vacina contendo o componente tetânico. Não vacinados e/ou histórico vacinal desconhecido: uma dose de dTpa e 2 doses de dT no esquema 0 - 2 - 6 meses. Para indivíduos que pretendem viajar para países nos quais a poliomielite é endêmica: recomenda-se a vacina dTpa combinada à pólio inativada (dTpa-VIP).
dT - Dupla adulto (difteria e tétano)	Para suscetíveis: duas doses com intervalo de dois meses
Varicela (catapora)	Dose única anual.
Influenza (gripe)	Dose única
Febre amarela	Dose única
Meningocócica conjugada ACWY	Dose única
Meningite B	2 doses no esquema 0-2
Pneumocócicas	Pneumocócica 13: dose única Pneumocócica 23: duas doses com intervalo de 5 anos
Herpes-zóster	Dose única acima dos 50 anos.
Dengue*	3 doses no esquema 0-6-12



VACINAÇÃO DO HOMEM (20-59 ANOS)

Vacinas	Esquemas e recomendações
HPV QUADRIVALENTE	3 doses no esquema 0-2-6 meses. Licenciada dos 9 aos 26 anos
Tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola)	É considerado protegido o homem que tenha recebido duas doses da vacina tríplice viral acima de 1 ano de idade, e com intervalo mínimo de um mês entre elas
Hepatites A, B ou A + B	Hepatite A: duas doses, no esquema 0 - 6 meses. Hepatite B: três doses, no esquema 0 - 1 - 6 meses. Hepatite A e B: três doses, no esquema 0 - 1 - 6 meses.
dTp acelular (difteria, tétano e coqueluche)	Com esquema de vacinação básico completo: reforço com dTpa a cada dez anos. Com esquema de vacinação básico incompleto: uma dose de dTpa a qualquer momento e completar a vacinação com dT (dupla adulto) de forma a totalizar três doses de vacina contendo o componente tetânico. Não vacinados e/ou histórico vacinal desconhecido: uma dose de dTpa e 2 doses de dT no esquema 0 - 2 - 6 meses. Para indivíduos que pretendem viajar para países nos quais a poliomielite é endêmica: recomenda-se a vacina dTpa combinada à pólio inativada (dTpa-VIP).
dT - Dupla adulto (difteria e tétano)	Para suscetíveis: duas doses com intervalo de dois meses
Varicela (catapora)	Dose única anual
Influenza (gripe)	Dose única
Febre amarela	Dose única
Meningocócica conjugada ACWY	Dose única
Meningite B	Dois doses com intervalo de dois meses
Pneumocócicas	Pneumocócica 13: dose única sem limite de idade. Pneumocócica 23: duas doses no intervalo de 5 anos.
Herpes-zóster	Dose única acima dos 50 anos.
Dengue*	3 doses no esquema 0-6-12

* Indicada para pacientes que já tiveram contato com o vírus - pacientes que já adquiriram a doença

CALENDÁRIO DE VACINAÇÃO IDOSOS

fonte: SBIm

VACINAS ESQUEMAS E RECOMENDAÇÕES

Influenza (Gripe)	Dose única
Pneumocócicas	Iniciar o esquema com Pneumocócica 13, seguida de uma dose de Pneumocócica 23 e uma segunda dose de pneumocócica 23 após cinco anos da primeira.
dTp acelular difteria, tétano e coqueluche	Com esquema de vacinação básico completo: reforço com dTpa a cada dez anos. Com esquema de vacinação básico incompleto: uma dose de dTpa a qualquer momento e completar a vacinação com dT (dupla adulto) de forma a totalizar três doses de vacina contendo o componente tetânico. Não vacinados e/ou histórico vacinal desconhecido: uma dose de dTpa e 2 doses de dT no esquema 0 - 2 - 6 meses. Para indivíduos que pretendem viajar para países nos quais a poliomielite é endêmica: recomenda-se a vacina dTpa combinada à pólio inativada (dTpa-VIP).
dT - Dupla adulto (difteria e tétano)	Para suscetíveis: duas doses, no esquema 0-6 meses. Hepatite B: Três doses, no esquema 0-1-6 meses. Hepatite A+B:Três doses, no esquema 0-1-6 meses.
Hepatites A, B ou A + B.	Dose única. Para idosos não previamente vacinados e residentes em áreas de risco avaliar de risco/benefício
Febre Amarela	Dose única
Meningocócica conjugada ACWY	Dose única
Tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola)	• É considerado protegido o indivíduo que tenha recebido, em algum momento da vida, duas doses da vacina tríplice viral acima de 1 ano de idade, e com intervalo mínimo de um mês entre elas. • Está indicada em situações de risco aumentado já que a maioria das pessoas nessa faixa etária é suscetível à essas doenças.
Herpes-zóster	Dose única.

* Consulte taxas e abrangências.

CALENDÁRIO DE VACINAÇÃO GESTANTE

fonte: SBIm

Vacinas	Esquemas e recomendações
RECOMENDADAS	
Histórico vacinal	Conduta na gestação
• Previamente vacinada, com pelo menos três doses de vacina contendo o componente tetânico.	• Uma dose de dTpa a partir da 20ª semana de gestação, o mais precocemente possível.
• Em gestantes com vacinação incompleta tendo recebido uma dose de vacina contendo o componente tetânico.	• Uma dose de dT e uma dose de dTpa, sendo que a dTpa deve ser aplicada a partir da 20ª semana de gestação, o mais precocemente possível. Respeitar o intervalo mínimo de um mês entre elas.
• Em gestantes com vacinação incompleta tendo recebido duas doses de vacina contendo o componente tetânico.	• Uma dose de dTpa a partir da 20ª semana de gestação, o mais precocemente possível.
• Em gestantes não vacinadas e/ou histórico vacinal desconhecido.	• Duas doses de dT e uma dose de dTpa, sendo que a dTpa deve ser aplicada a partir da 20ª semana de gestação. Respeitar intervalo mínimo de um mês entre elas.
Hepatite B	Três doses, no esquema 0 - 1 - 6 meses
Influenza (gripe)	Dose única
RECOMENDADAS EM SITUAÇÕES ESPECIAIS	
Hepatite A	Dois doses, no esquema 0 - 6 meses.
Hepatite A e B	Para menores de 16 anos: duas doses, aos 0 - 6 meses. A partir de 16 anos: três doses, aos 0 - 1 - 6 meses.
Pneumocócicas	Esquema sequencial de VPC13 e VPP23 pode ser feito em gestantes de risco para doença pneumocócica invasiva (DPI) (consulte os Calendários de vacinação SBIm pacientes especiais).
Meningocócica conjugada ACWY	Uma dose. Considerar seu uso avaliando a situação epidemiológica e/ou a presença de comorbidades consideradas de risco para a doença meningocócica (consulte os Calendários de vacinação SBIm pacientes especiais)
Meningocócica B	Dois doses com intervalo de um a dois meses. Considerar seu uso avaliando a situação epidemiológica e/ou a presença de comorbidades consideradas de risco para a doença meningocócica (consulte os Calendários de vacinação SBIm pacientes especiais).
Febre amarela	Normalmente contraindicada em gestantes. Porém, em situações em que o risco da infecção supera os riscos potenciais da vacinação, pode ser feita durante a gravidez.
CONTRAINDICADAS	
Tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola)	Não vacinar na gestação
HPV	Não vacinar na gestação. Se a mulher tiver iniciado esquema antes da gestação, suspendê-lo até puerpério.
Varicela (catapora)	Não vacinar na gestação
Dengue	Não vacinar na gestação

A Unidade de Vacinação é aberta ao público.
Av. Bady Bassitt, 4870 • Alto Rio Preto
Para mais informações sobre as vacinas ligue:
17 3202 1112 • Seg a Sex: 8h às 19h. Sáb: 8h às 14h.
A próxima dose poderá estar em falta na Unimed (ruptura de mercado)

Vacinação domiciliar*
Agende por telefone.

CUIDAR DE VOCÊ. ESSÉ É O PLANO.

Unimed
S. J. do Rio Preto

14340-000



VACINAÇÃO É PARA TODOS

Calendário para Idosos

Vacinas

Esquemas e recomendações

Influenza (Gripe)

Dose única anual.

Pneumocócicas (VPC13) e (VPP23)

Iniciar com uma dose da VPC13 seguida de uma dose de VPP23 seis a doze meses depois, e uma segunda dose de VPP23 cinco anos depois da primeira.

Tríplice bacteriana acelular do tipo adulto (dTpa) / Difteria, tétano e coqueluche

• Atualizar dTpa independente de intervalo prévio com dT ou TT.
• Para idosos que pretendem viajar para países nos quais a poliomielite é endêmica recomenda-se a vacina dTpa combinada à pólio inativada (dTpa-ViP).
• A dTpa-ViP pode substituir a dTpa.
Com esquema de vacinação básico para tétano completo: reforço com dTpa a cada dez anos.
Com esquema de vacinação básico para tétano incompleto: uma dose de dTpa a qualquer momento e completar a vacinação básica com uma ou duas doses de dT (dupla bacteriana do tipo adulto) de forma a totalizar três doses de vacina contendo o componente tetânico.

Hepatites A e B

Hepatite A: após avaliação sorológica ou em situações de exposição ou surtos. Duas doses, no esquema 0 - 6 meses.
Hepatite B: rotina. Três doses, no esquema 0 - 1 - 6 meses.
Hepatite A e B: Três doses, no esquema 0 - 1 - 6 meses.

Febre Amarela

Uma dose para residentes ou viajantes para áreas de vacinação (de acordo com classificação do MS e da OMS). Se persistir o risco, fazer uma segunda dose dez anos após a primeira. Vacinar pelo menos dez dias antes da viagem.

Meningocócica conjugada ACWY

Uma dose. A indicação da vacina, assim como a necessidade de reforços, dependerão da situação epidemiológica.

Tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola)

• É considerado protegido o indivíduo que tenha recebido, em algum momento da vida, duas doses da vacina tríplice viral acima de 1 ano de idade, e com intervalo mínimo de um mês entre elas.
• Está indicada em situações de risco aumentado já que a maioria das pessoas nessa faixa etária não é suscetível à essas doenças.

Herpes-zóster

Dose única.



A **Unidade de Vacinação** é aberta ao público.

Av. Bady Bassitt, 4870 • Alto Rio Preto
Fone: 17 3202 1112 • Seg a Sex: 8h às 19h. Sáb: 8h às 14h.

www.unimed.com.br

CUIDAR DE VOCÊ. ESSE É O PLANO.

Unimed 
S. J. do Rio Preto

ANS n.º 335100
SAC 0800 772 9467